

Contacts

Vous désirez plus d'informations ou adresser un de vos patients ?

Vous pouvez contacter le secrétariat :

Gastro-entérologie

05.59.44.37.22

secr.gastro@ch-cotebasque.fr

Essais ouverts en cours d'inclusion en Gastroentérologie (1)

Oncologie

Intestin grêle

PRODIGE 33 – BALLAD*



- Adénocarcinome de l'intestin grêle stade I, II ou III complètement réséqué (R0)
- Absence de métastase

**Chimiothérapie adjuvante 5FU +/-
Oxaliplatine
VS
Observation seule**

Pancréas

PRODIGE 61 - FUNGEMAX*



- Cancer du pancréas métastatique
- 1ère ligne

**5-FU/LV+ Nal-IRI, Gemcitabine+Nab-
paclitaxel en alternance tous les 2 mois**

carcinome neuro endocrine, _ hepato cellulaire

PRODIGE 69 FOLFIRINEC*



Folfirinox versus platine-étoposide en première ligne de traitement des carcinomes neuroendocrines peu différenciés de grade 3 métastatiques gastro-entéro-pancréatique et de primitif inconnu associé à l'établissement d'un profil moléculaire

COLON

PRODIGE 34 – ADAGE*



- Adénocarcinome colique stade III
- Adjuvant

**Chimiothérapie adjuvante VS
surveillance**

PRODIGE 70 – CIRCULATE*



- Cancer colorectal de stade II R0
- Adjuvant

**Evaluation de la présence d'ADNtc post-
op comme critère de sélection pour la
réalisation d'une CT adjuvante**

Essais ouverts en cours d'inclusion en Gastroentérologie (2)

Oncologie

Colorectal

PRODIGE 49 – OSCAR*



- Cancer colorectal métastatique limité au foie
- 1ère ligne

***Oxaliplatine intra-artérielle
versus
Oxaliplatine en intraveineux associé au
LV5FU2 + Thérapie ciblée***

PRODIGE 71 - BEVAMAIN*



- Cancer colorectal métastatique
- Après 4 à 6 mois de chimiothérapie d'induction

***Fluoropyrimidine + bevacizumab versus
fluoropyrimidine (Xeloda ou LV5FU
simplifié)***

FFCD 1703 – POCHI*



- Cancer colorectal métastatique microsatellite Stable MSS et un fort infiltrat immunitaire

Pembrolizumab + Xelox-Bevacizumab

ONCOGRAMME



Impact de l'utilisation de l'Oncogramme® pour orienter la 1ère ligne de traitements chez des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique sur la survie sans progression, les couts de prise en charge, l'efficacité et la qualité de vie par rapport à la prise en charge habituelle.

PANCREAS

Essais ouverts en cours d'inclusion en Gastroentérologie (4)

MICI



In-TARGET*

- Rectocolite hémorragique active
Mayo ≥ 6 avec mayo endoscopique ≥ 2

Golimumab (anti-TNF)



DEEPER*

Essai thérapeutique randomisé, contrôlé, en ouvert, multicentrique, à deux bras parallèles, comparant une stratégie de suivi innovante à une stratégie de suivi courante **DANS LA MALADIE DE CROHN**



SPACIFIX

Comparaison de l'espacement des perfusions d'infliximab guidé par le dosage des taux résiduels **d'infliximab** à un espacement guidé par la clinique chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin en rémission profonde

Essais ouverts en cours d'inclusion Gastroentérologie (5)

MICI

CONTROL*



Prise en charge standard à un traitement ciblé incluant la télésurveillance et l'éducation thérapeutique chez recto colite hémorragique débutant **l'adalimumab**

HYRISS*



A multicenter, international, prospective, non-interventional, observational study, to assess treatment retention of an adalimumab biosimilar (Hyrimoz®) in IBD patients in real life setting

POMEROL*



Prise en charge de la récurrence postopératoire modérée dans la maladie de Crohn: un essai contrôlé randomisé évaluant l'intérêt d'une escalade thérapeutique

DOPER*



VeDolizumab PERSistence in IBD patients after switching from intravenous to subcutaneous administration: a real-life

CAPABLES*



**Cohorte prospective ANGH
des Pancréatites Aigues
Biliaires Légères Et Sévères**