

Pour éviter de contaminer le bébé avant qu'il ne soit immunisé, il est recommandé de :

- Vérifier les vaccins **de la future maman**, pour qu'elle puisse transmettre des anticorps au nourrisson en attendant qu'il ait atteint un âge lui permettant d'être lui-même vacciné. Certains vaccins sont à éviter pendant la grossesse, d'où l'importance de faire le point AVANT d'être enceinte.
- Vérifier les vaccins **de l'entourage de l'enfant à naître**, pour éviter de contaminer l'enfant avant qu'il ne soit immunisé.
Il s'agit des personnes vivant au même domicile (**parents, frères et sœurs**), ou le fréquentant régulièrement (**grands-parents...**) ou s'occupant de sa garde (**assistante maternelle, personnel de crèche, nounou à domicile...**). L'entourage peut être vacciné à tout moment et le plus tôt possible avant tout contact avec le bébé.



Où se faire vacciner ?

- **Auprès de votre médecin** (généraliste, gynécologue, pédiatre).
- **Auprès de votre sage-femme** : elle peut prescrire et pratiquer la vaccination de toutes les femmes dans le cadre du suivi gynécologique et pendant la grossesse, ainsi que de l'entourage de la femme enceinte jusqu'à 8 semaines après l'accouchement.
- **Au Centre Gratuit de Vaccination** :
Le CHCB propose un service public gratuit de vaccination ouvert à toutes les personnes de plus de 6 ans.
N'oubliez pas de vous munir de votre carnet de santé ou de vaccination.



Centre Gratuit de Vaccination

Prise de RDV ☎ 05 59 44 32 98


- Site de Bayonne :
13, Avenue de l'interne Jacques Loëb
- Site de Saint-Jean-de-Luz :
19, Avenue André Ithurralde

Consultez notre site : www.ch-cotebasque.fr

PAO - Service communication - photo Freepik



Vaccination dans l'entourage d'un nourrisson



Vous êtes au contact de jeunes enfants ou envisagez de devenir parent dans les mois ou années à venir ? Pour protéger le bébé, prenez le temps de faire le point sur **vos** vaccinations.

Quels risques peuvent être évités pour le bébé et comment ?

Type de vaccin	Recommandations	Les risques que le vaccin permet d'éviter	Quand vacciner la maman ?
Vaccin contre la rubéole, les oreillons et la rougeole = ROR	Ce vaccin est en général réalisé pendant l'enfance. Toute personne née depuis 1980 doit avoir reçu 2 doses espacées d'au moins 1 mois (1 seule dose si née avant 1980 et pas d'antécédents de ces maladies).	<ul style="list-style-type: none"> Fausse couche (oreillons, rubéole), pneumonie rougeoleuse pendant la grossesse. Complications neurologiques graves chez l'enfant liés à la rubéole (cécité, surdité, retard mental,...). 	Ces vaccins sont contre-indiqués pendant la grossesse (il est souhaitable d'éviter une conception dans le mois qui suit la vaccination). Toutefois, s'ils sont administrés par mégarde à une femme enceinte, cela ne justifie pas d'interrompre la grossesse. Ils sont à réaliser AVANT la grossesse ou juste après l'accouchement. Au cours de l'allaitement, le vaccin ROR peut être administré et le vaccin contre la varicelle est envisageable en cas d'exposition.
Vaccin contre la varicelle	Une femme en âge de procréer et non immunisée (pas de souvenir de varicelle dans l'enfance et sérologie négative) doit recevoir 2 doses espacées de 4 à 8 semaines.	<ul style="list-style-type: none"> Malformations congénitales (infection pendant les 4 premiers mois de grossesse) Varicelle grave chez l'enfant à la naissance (infection autour de l'accouchement). 	
Vaccin contre la coqueluche (combiné au vaccin diptérie, tétaños et poliomyélite = dTcaPolio)	Ce vaccin est en général réalisé à l'âge de 2 mois, 4 mois, 11 mois, 6 ans, 12 ans puis à 25 ans. Dans l'entourage d'un enfant de moins de 6 mois, 1 dose est recommandée chez les personnes : <ul style="list-style-type: none"> - de plus de 25 ans dont le dernier rappel date de plus de 10 ans. - adolescents et adultes de moins de 25 ans dont le dernier rappel date de plus de 5 ans. Un délai d'un mois doit être respecté avec une injection antérieure de dTPolio. En cas de coqueluche documentée, l'immunité naturelle dure environ 10 ans.	<ul style="list-style-type: none"> La coqueluche est une maladie grave lorsqu'elle survient dans les 6 premiers mois de vie. C'est l'une des premières causes de décès par infection bactérienne des nourrissons de moins de 3 mois. 	Ce vaccin n'est, pour l'instant, pas recommandé en France métropolitaine pendant la grossesse . Il est à réaliser AVANT la grossesse ou juste après l'accouchement, même en cas d'allaitement .
Vaccin contre le méningocoque C	Une dose est recommandée chez les enfants et jeunes adultes jusqu'à 24 ans révolus qui n'ont pas été vaccinés auparavant.	<ul style="list-style-type: none"> Le méningocoque peut entraîner une infection dite invasive (méningite ou septicémie) dont l'évolution peut conduire au décès. 	Ce vaccin est à réaliser dans l'idéal avant d'être enceinte et peut être envisagé pendant la grossesse en cas d'exposition. La vaccination est possible pendant l'allaitement.
Vaccin contre la grippe saisonnière	Recommandé chez toutes les femmes enceintes.	<ul style="list-style-type: none"> Fausse couche, accouchement prématuré, complications respiratoires graves pendant la grossesse. Grippe grave chez l'enfant, complications chez les nourrissons à risque. 	A réaliser au moment de la campagne de vaccination antigrippale, quel que soit le stade de la grossesse .