

Contacts

**Vous désirez plus d'informations ou adresser un de vos patients ?
Vous pouvez contacter le secrétariat :**

Oncologie

05.59.44.37.62

secr.onco@ch-cotebasque.fr

Essais ouverts en cours inclusion : Oncologie Cancers du sein



VITAL

Étude observationnelle multicentrique nationale longitudinale évaluant l'efficacité et la tolérance en Vie réelle de **TALZENNA®** (**talazoparib**) chez les patients atteints d'un cancer du sein HER2 négatif localement avancé ou métastatique avec mutation **BRCA**



LESS

Single-arm study to de-escalate adjuvant endocrine therapy duration in women with HR+ HER2- breast cancer at very low risk of metastase



WO43571 / heredERA

A PHASE III, RANDOMIZED, OPEN-LABEL STUDY
EVALUATING THE EFFICACY AND
SAFETY OF
GIREDESTRANT IN COMBINATION
WITH PHESGO

RH+ / HER2+
1ère ligne
Avancé ou métastatique
Giredestrant + Phesgo
VS
Phesgo +/- hormonothérapie



EMBER-4 / J2J-MC-JZLH

Etude de Phase 3, comparant **l'imlunestrant** à l'hormonothérapie standard en adjuvant chez des patients ayant précédemment reçu 2 à 5 années d'hormonothérapie adjuvante pour un cancer du sein précoce ER+ et HER2- avec un risque accru de récidive

Essais ouverts en cours inclusion : Oncologie

Cancers du sein



RIBOLARIS



Ribociclib et endocrinothérapie en traitement néoadjuvant et adjuvant du cancer du sein avec statut des récepteurs à oestrogènes positif (RE+) et HER2 négatif à risque clinique élevé

AMBRE



- 1ère ligne métastatique avec atteinte viscérale
- RH+ / HER2 -
- ≥ 3 lésions sur un site ou ≥ 2 sites atteints ou épanchement séreux

Hormonothérapie + inhibiteur CDK4-6

Versus

Xeloda ou Taxol

Essais ouverts en cours inclusion : Oncologie Cancers ovaire, endomètre

TEDOVA



- Maintenance pour les cancers ovaires en rechute
- Platine sensible
- 1ère ou 2ème rechute en réponse complète, partielle ou stable.

Observation/soins courants

Versus

Vaccin OSE2101

Versus

Vaccin OSE2101 + Pembrolizumab

NIICHE/MITO-33



- Cancer des ovaires, des trompes de Fallope ou d'un cancer péritonéal primaire non éligibles à un traitement à base de platine

*Chimio au choix (Caelyx, Paclitaxel,
Gemcitabine, Topotécan)*

VS

Dostarlimab + Niraparib



MORAb

(cancer endomètre)

Essai de phase 1/2 multicentrique en ouvert innocuité, la tolérance et l'efficacité de MORAb 202, anticorps médicament conjugué ciblant le récepteur alpha (FRα)

Essais ouverts en cours inclusion : Oncologie

Cancers prostate vessie

Cancer de prostate



PEACE-6 Unfit


- Patient fragile métastatique au diagnostic, sensible à castration

Darolutamide + ADT

Versus

Placebo + ADT

Cancer de Vessie




VOLGA

- Patient fragile métastatique au diagnostic, sensible à castration

*Durva+Treme+EV Puis cystectomie _
Durva+Treme_ Durva / Durva+EV_
Cystec_ Durva / Cystectomie*

Essais ouverts en cours inclusion : Oncologie

Cancers du rein



SPICI

Pause thérapeutique après un traitement associant un modulateur de la réponse immunitaire et un anti angiogénique en première ligne chez les patients présentant un cancer du rein métastatique de groupe pronostic favorable ou de groupe pronostic intermédiaire avec un seul critère de mauvais pronostic présentant une réponse objective

Essais ouverts en cours inclusion : Oncologie

Cancers tête et cou

OSKAR



**Utilisation en vie réelle du
pembrolizumab chez des patients
atteints d'un cancer de la tête et
du cou métastatique ou récidivant non
résécable en France : étude non
interventionnelle,
prospective, multicentrique, avec
appariement à la base de données du
système de santé français**

Essais ouverts en cours inclusion : Oncologie

Cancers poumon digestif

COPE



- Analyse séquentielle de l'ADN tumoral circulant
- 1ère ligne
- Cancer colorectal et cancer bronchique non à petites cellules

Suivi associant l'imagerie conventionnelle et l'analyse de l'ADN tumoral circulant

Versus

Suivi conventionnel par imagerie seule

Essais ouverts en cours inclusion : Oncologie

Cancers métastatiques (rein, poumon, mélanome, vessie)



MOIO



Essai randomisé de phase III comparant l'immunothérapie (IO) standard, par inhibiteurs des points de contrôle immunitaire, versus une diminution de la dose intensité de l'IO chez les patients ayant un cancer métastatique en réponse après 6 mois d'IO standard

Essais ouverts en cours inclusion : Oncologie Autres



ATX01-22-01



Neuropathie périphériques chimio-induites

Étude de phase 2 multicentrique, randomisée, en double aveugle, menée en groupes parallèles et contrôlée par placebo visant à évaluer **l'efficacité et l'innocuité de l'ATX01 par rapport à un placebo, chez des patients adultes ayant surmonté un cancer, atteints de neuropathie périphérique chimio-induite (NPCI)**

FRONE/GERONTE

Oncogériatrie chez des patients atteints de différents cancers

Essais ouverts en cours inclusion : Oncologie

Autres



GIG-T



**Etude évaluant la
thromboprophylaxie chez
des patients présentant
une tumeur
germinale avancée de
bon pronostic ou de
pronostic intermédiaire**

Essais ouverts en cours inclusion : Oncologie Observatoires, Registres



DiaCaRMETS

**Etude observationnelle sur la
prise en charge des patients
dialysés traités pour un cancer du
rein métastatique sous
traitement systémique**